XXV Jornadas Nacionales INFECTOLOGÍA

Caracterización Clínica y Epidemiológica de Pacientes con Síndrome Adenomegálico en Edades Pediátricas

Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica – Hospital General Nacional "Dr. Ángel Larralde", Valencia, Venezuela. Periodo 2023-2024

Arana. S. Roxana; Aguilar Yajaira; Valera Aracelys

INTRODUCCIÓN

El síndrome adenomegálico es frecuente en pediatría y, aunque suele ser benigno, requiere evaluación clínica para descartar enfermedades graves. Esta investigación caracteriza a pacientes menores de 14 años en el Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Dr. Ángel Larralde (2023-2024) para mejorar el diagnóstico precoz y las oportunidades de tratamiento.

OBJETIVOS

Describir las características epidemiológicas de pacientes pediátricos con adenomegalias (edad, sexo, procedencia y estrato socioeconómico), identificar sus manifestaciones clínicas iniciales, caracterizar las adenopatías (tamaño, consistencia y localización), determinar los hallazgos paraclínicos y conocer el manejo terapéutico, relacionando el diagnóstico clinicopatológico según el grupo etario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio cuantitativo, observacional-descriptivo, retrospectivo y transversal.
Población: Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, HGN "Dr. Ángel Larralde", 2023-2024.
Muestra no probabilística deliberada: 37 pacientes menores de 14 años con síndrome adenomegálico.
Recolección: revisión documental de historias clínicas.
Análisis estadístico descriptivo con SPSS v.18.

RESULTADOS

Grupo etáreo	F	%
Lactante	1	2,70
Pre escolar	10	27,03
Escolar	22	59,46
Adolescente	4	10,81
Sexo	**F**	**%**
Femenino	9	24,32
Masculino	28	75,68
Procedencia	**F**	**%**
XX	10	27,03
Otro Estado	10	27,03
XX	6	16,22
XX	6	16,22
XX	3	8,11
XX	1	2,70
XX	1	2,70
Total	37	100

Fiebre	F	%
Si	28	75,68
No	9	24,32
Pérdida de peso	**F**	**%**
Si	22	59,46
No	15	40,54
Dolor e inflamación	**F**	**%**
Si	22	59,46
No	15	40,54
Malestar	**F**	**%**
Si	25	67,57
No	12	32,43
Evolución	**F**	**%**
Menos o igual 3 meses	18	48,65
3 a 6 meses	9	24,32
12 a 24 meses	9	24,32
25 a 48 meses	1	2,70
Total	37	100

DISCUSIÓN

El síndrome adenomegálico es más común en varones escolares y se manifiesta con fiebre, malestar, pérdida de peso y adenopatías cervicales. Los diagnósticos incluyen serología viral, hemograma y ecografía, siendo la mayoría de las patologías benignas, con el linfoma de Hodgkin como la principal causa maligna.

CONCLUSIÓN

El síndrome adenomegálico en niños del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital General Dr. Ángel Larralde fue más frecuente en escolares y en varones. Las principales manifestaciones clínicas incluyeron fiebre, malestar general y pérdida de peso, con adenopatías cervicales como las más comunes. Se utilizaron principalmente serología viral, hemograma y ecografía, favoreciendo métodos no invasivos en la evaluación inicial.

BIBLIOGRAFÍAS

1.Tua Saúde. Adenomegalia: qué es, causas y cuándo puede ser cáncer [Internet]. Tua Saúde; 2024 [citado 2024 Oct 30]. Disponible en: https://www.tuasaude.com/es/adenomegalia/
2.Pediatría (Asunción). Adenomegalias en niños: abordaje diagnóstico en el Consultorio de Hemato-oncología de un Hospital de Referencia [Internet]. 2014 [citado 2024 Oct 30];41(3):251-8. Disponible en: https://revistaspp.org/index.php/pediatria/article/view/297
3.Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins y Cotran: Patología estructural y funcional. 9a ed. Madrid: Elsevier; 2014. Disponible en Elsevier: https://www.elsevier.com